


Procedimiento de endoscopia superior

La detección salva vidas

Un procedimiento de endoscopia superior examina visualmente el sistema digestivo superior. Se utiliza para diagnosticar y, a veces, tratar afecciones que afectan la parte superior del sistema digestivo.

Su gastroenterólogo puede utilizar este procedimiento para:

- Investigar los síntomas que está experimentando.
- Diagnosticar una enfermedad mediante la recolección de muestras de tejido (biopsia) o detectar algunos tipos de cáncer.
- Tratar problemas de salud digestiva como eliminar un pólipo, detener un sangrado o ensanchar un esófago estrecho.



Preparación para su examen: Qué llevar

- Un familiar o amigo (mayor de 18 años) que lo lleve a su casa. Puede tomar un taxi, transporte médico o autobús solo si un familiar o amigo viaja con usted después de su visita.
- Todos los medicamentos que toma, incluso los de venta libre.
- Cualquier vitamina y suplemento que tome.
- Su tarjeta de seguro.

Medicamentos

Puede tomar sus medicamentos recetados con sorbos de agua hasta 6 horas antes de su endoscopia superior (excepto aquellos medicamentos que su médico le haya indicado que suspenda).

Preparación para la endoscopia superior

El día antes de su procedimiento

- Es posible que tenga una dieta regular el día anterior a su endoscopia digestiva alta.
- Puede tomar sus medicamentos recetados el día anterior a su procedimiento (excepto aquellos medicamentos que su médico le haya indicado que suspenda).
- **NADA DE ALCOHOL** el día anterior a su endoscopia superior.
- **No coma nada después de la medianoche.**

Preparación para la endoscopia superior

CONDICIONES ESPECIALES

- **Diabetes:** consulte con su médico qué medicamentos puede tomar el día anterior y la mañana de su procedimiento. En general, se recomienda suspender cualquier medicamento oral para la diabetes e insulina la mañana de su procedimiento. Lleve consigo todos los medicamentos para la diabetes para tomarlos después de que termine el procedimiento, cuando haya reanudado su dieta normal. El día de la intervención se comprobará su nivel de azúcar en sangre.
- **Anticoagulantes:** pregúntele a su médico cómo tomar aspirina, Plavix (clopidogrel), Coumadin (warfarina), Lovenox, heparina o cualquier otro anticoagulante antes y después del procedimiento.

El día de su procedimiento

Llegue a su examen a la hora indicada por nuestro equipo de atención médica. La hora en que comienza su examen puede cambiar.

- **No beba nada 6 horas antes de su endoscopia superior.**
- Puede tomar sus medicamentos recetados el día anterior a su procedimiento (excepto aquellos medicamentos que su médico le haya indicado que suspenda).
- Llegue a la recepción del hospital **60 minutos antes de la hora** programada de su procedimiento para registrarse.
- Planee estar en el hospital de 2 a 4 horas.
- Use ropa cómoda y holgada que sea fácil de quitar y poner, y zapatos cómodos. **No use joyas y no traiga objetos de valor.**

■ UChicago Medicine AdventHealth Locations

500 Remington Boulevard, Bolingbrook, IL 60440 **630-312-5000**

701 Winthrop Avenue, Glendale Heights, IL 60139 **630-545-8000**

120 North Oak Street, Hinsdale, IL 60521 **630-856-9000**

5101 Willow Springs Road, La Grange, IL 60525 **708-245-9000**

Después del procedimiento

- Puede reanudar una dieta regular, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Su médico hablará con usted sobre los resultados de su procedimiento en el área de recuperación una vez que esté completamente despierto.

En caso de tener alguna pregunta, llame al consultorio al: **630-312-2590**.

En caso de tener alguna pregunta fuera del horario de atención, llame al mismo número y seleccione la opción para localizar al médico de guardia. **Un médico está de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder cualquier pregunta o inquietud que tenga.**